

SON PREMIER COUP DE POUCE, C'EST VOUS !

Une vaccination contre la bronchiolite pendant la grossesse protège votre bébé jusqu'à ses 6 mois.



POURQUOI SE FAIRE VACCINER ?

La vaccination **contre le virus de la bronchiolite (VRS)** est possible entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée (SA). Elle est recommandée pour les **futures mamans** pendant la saison hivernale.

Le vaccin est disponible de septembre 2026 à février 2027

Parlez-en à votre sage-femme, médecin
ou pharmacien



PENDANT LA GROSSESSE, SE FAIRE VACCINER CONTRE LA BRONCHIOLITE PROTÈGERA VOTRE BÉBÉ PENDANT LES PREMIERS MOIS DE VIE

**LA BRONCHIOLITE N'EST PAS UNE FATALITÉ,
ENTRE LE MOIS DE SEPTEMBRE 2026 ET LE MOIS DE FÉVRIER 2027,
IL EXISTE UN MOYEN DE PRÉVENTION POUR PROTÉGER VOTRE BÉBÉ
DÈS LA GROSSESSE DES BRONCHIOLITES LES PLUS GRAVES (À VRS *)**

Ce vaccin est pris en charge à 100% par l'assurance maladie.

Une injection du vaccin ABRYSCO peut être réalisée chez la femme enceinte entre 32 et 36 SA (idéalement à 32 SA), la vaccination se fait en intramusculaire dans le deltoïde (l'épaule) Cette vaccination maternelle va permettre de protéger le bébé des hospitalisations pour bronchiolites dans 80% des cas.

* VRS = Virus Respiratoire Syncytial

IMPORTANT

La vaccination peut être réalisée chez votre pharmacien, votre médecin, votre sage-femme, votre infirmier ou dans un centre de vaccination. Faire l'injection dès 32 SA permettra d'avoir une production d'anticorps suffisante qui sera transmise au bébé à travers le placenta



LA BRONCHIOLITE, C'EST QUOI ?

La bronchiolite est une infection respiratoire, virale et contagieuse qui touche les enfants de moins de 2 ans.

?

LES SYMPTÔMES

Votre enfant ressent une gêne respiratoire. Sa respiration est rapide et sifflante, accompagnée de toux.

ET TOUJOURS, LES GESTES SIMPLES À ADOPTER

- 1 Lavez-vous les mains régulièrement
- 2 Aérez la chambre et les pièces de vie
- 3 Évitez l'exposition au tabac
- 4 Évitez les endroits confinés et très fréquentés (supermarchés, transports en commun, ...)
- 5 Évitez les contacts avec les personnes enrhumées
- 6 Portez un masque si vous êtes malade
- 7 Évitez le partage de tétines, biberons, jouets avec d'autres enfants, et lavez-les régulièrement